Pollution de l'air et développement de l'enfant

Johanna Lepeule
Chercheur, Inserm

& Isabelle Pin
Pneumo-pédiatre, CHUGA

Equipe d'Epidémiologie environnementale appliquée
au développement et à la santé respiratoire

Fardeau Mondial - 2017

Global Burden of Air Pollution

Deaths from air pollution in 2017

Air pollution was responsible for nearly 5 million deaths in 2017

Source:

GBD 2017 Risk Factors Collaborators. Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. *The Lancet*, Vol. 392, No. 10159, p1923–1994. Published November 10, 2018. Available at: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)32225-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32225-6)

UNIVERSITY of WASHINGTON

www.stateofglobalair.org

Pollution atmosphérique

Polluants gazeux,
particulaires

Sources →

Particules fines

Pollution atmosphérique et santé publique

Fréquence d'exposition élevée

- 100% de la population exposée
- Exposition contrôlable
- Niveaux régulés mais expositions réelles > seuils recommandés

Longue liste d'effets sanitaires

Effet causal des PM_{2.5} sur :

- mortalité à court et long terme
- morbidité cardiovasculaire à court et long terme

IARC 2013: pollution de l'air est cancérogène pour l'homme (groupe 1)

Effets certains ou très probables des PM_{2.5}

Poumons

- Inflammation
- Stress oxydatif
- Exacerbation de la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), de l'asthme
- Diminution de la fonction respiratoire
- Cancer du poumon

Cœur

- Altération de la fonction cardiaque
- Stress oxydatif
- Augmentation de l'ischémie cardiaque
- Augmentation du risque d'infarctus

Cerveau et système nerveux

- Inflammation et stress oxydatif cérébral
- Système nerveux sympathique
- Fonction cognitive, neurodégénérescence

Circulation sanguine

- Coagulation augmentée
- Athérosclérose
- Dysfonction endothéliale
- Hypertension, vasoconstriction

Mise en place d'une réglementation dans la majorité des pays industrialisés, USA 1950, France et UE 1970-80

Origines développementales des maladies et de la santé

Exposome urbain (pollution de l'air, climat,...)

Concept de la DOHaD
(Developmental Origins of Health and Diseases)

Barker et al, Lancet, 1989

David Barker,
1938-2013

Croissance, développement neuropsychologique, respiratoire, etc.

Dysfonctionnements et maladies chroniques métaboliques,
cardiovasculaire, respiratoires, neuropsychologiques

Cohortes mère-enfant et de naissance – exemples français

Objectifs: caractériser les facteurs associés au développement de l'enfant

Cohorte nationale de naissance

2010-2011
n=18 000 enfants

2003-2006
n=3421 couples mère-enfant

2002-2006
n=2002 couples mère-enfant

2014-2017
n=480 trios père-mère-enfant

cohorte de nouvelle génération

Evaluation de l'exposition à la pollution atmosphérique

- Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA)

Points de mesure réglementaires NO₂ 2020

Evaluation de l'exposition à la pollution atmosphérique

- Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA)
- Modélisations en air ambiant
- Capteurs personnels

Hough 2021

Pollution de l'air et issues de grossesse

Projet ESCAPE (European Study of Cohorts for Air Pollution Effects),
n=70 000 naissances

*Petit poids de naissance
à terme (<2500gr)*

Périmètre crânien

One-pollutant models†	Odds ratio (95% CI)
PM _{2.5}	1.18 (1.06–1.33)
PM _{2.5-10}	1.01 (0.88–1.15)
PM ₁₀	1.16 (1.00–1.35)
PM _{2.5} absorbance	1.17 (0.95–1.39)
NO ₂ in areas with PM _{2.5}	1.05 (0.95–1.16)
NO ₂ in all areas	1.09 (1.00–1.19)
NO _x in all areas	1.04 (0.97–1.11)
Traffic density on nearest street	1.06 (1.01–1.11)
Traffic load on major road within 100 m	1.01 (0.96–1.07)

	Change in birth head circumference (cm)
PM _{2.5}	-0.08 (-0.12 to -0.03)
PM _{2.5-10}	-0.09 (-0.12 to -0.05)
PM ₁₀	-0.13 (-0.18 to -0.09)
PM _{2.5} absorbance	-0.18 (-0.22 to -0.13)
NO ₂	-0.08 (-0.10 to -0.07)
NO _x	-0.06 (-0.07 to -0.05)
Traffic density on nearest street	-0.02 (-0.03 to -0.01)
Traffic load on major road	-0.02 (-0.05 to 0.00)

For a 5 µg/m³ increase in PM_{2.5} ; for a 10 µg/m³ increase in PM₁₀ and NO₂ ; For a 20 µg/m³ increase in NO_x

Pollution de l'air (PM_{2.5}) et issues de grossesse – pays en développement

Enquête de l'OMS: 22 pays d'Afrique, Asie, Amérique latine

Table 2. Adjusted ORs (95% CI) for preterm birth and LBW associated with a 10- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ increase in PM_{2.5} and with quartiles of PM_{2.5} (relative to the lowest quartile) after adjusting exposure estimates to account for seasonality, WHO Global Survey on Maternal and Perinatal Health, 2004–2008.

Outcome	Model 1	Model 2
Preterm birth		
PM _{2.5} (10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.96 (0.91, 1.02)	0.96 (0.90, 1.02)
< 6.35	1.0 (Reference)	1.0 (Reference)
6.35 to < 12.32	1.08 (0.95, 1.22)	1.08 (0.95, 1.24)
12.32 to < 22.20	1.05 (0.90, 1.23)	1.06 (0.90, 1.25)
≥ 22.20	0.96 (0.79, 1.17)	0.96 (0.79, 1.18)
LBW		
PM _{2.5} (10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.00 (0.97, 1.03)	0.99 (0.96, 1.01)
< 6.298	1.0 (Reference)	1.0 (Reference)
6.298 to < 11.96	1.06 (0.97, 1.16)	1.05 (0.95, 1.16)
11.96 to < 20.16	1.19 (1.06, 1.33)	1.15 (1.02, 1.30)
≥ 20.16	1.22 (1.07, 1.39)	1.15 (1.01, 1.32)

All models are GEE models with a logit link. All models were adjusted for mother's age, education, parity, prenatal care, and infant's sex. Model 2 also adjusted for country-level variables GDP per capita, urbanicity, health care expenditure per capita, and Gini coefficient. Models for 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM_{2.5} and quartiles of PM_{2.5} were run separately. PM_{2.5} levels were seasonally adjusted.

Pollution de l'air (NO₂) et croissance foetale

Table 2. Exposure to NO₂ in different stages of pregnancy and SD s 2003–2008 (Spain).

Fetal score (weeks)	n	NO ₂ (per 10-μg/m ³ increase)		
		% diff ^a (95% CI)	p-Value ^b	I ² (%) ^c
BPD growth at 0–12				
NO ₂ 0–12	2,389	-1.1 (-2.5, 0.2)	0.10	0
BPD growth at 12–20				
NO ₂ 0–12	2,312	-0.2 (-1.5, 1.2)	0.84	0
NO ₂ 12–20	2,330	0.7 (-0.6, 2.0)	0.28	17.2
BPD growth at 20–34				
NO ₂ 0–12	2,328	-2.6 (-3.9, -1.2)	<0.01	0
NO ₂ 12–20	2,325	-1.9 (-3.2, -0.6)	<0.01	0
NO ₂ 20–34	2,222	0.0 (-1.4, 1.5)	0.96	0
FL growth at 0–12				
NO ₂ 0–12	2,310	-1.3 (-2.7, 0.2)	0.08	0
FL growth at 12–20				
NO ₂ 0–12	2,405	-0.4 (-2.0, 1.2)	0.48	0
NO ₂ 12–20	2,406	-1.2 (-2.5, 0.1)	0.07	8.2
FL growth at 20–34				
NO ₂ 0–12	2,270	-0.8 (-2.1, 0.6)	0.26	0
NO ₂ 12–20	2,252	0.1 (-1.5, 1.7)	0.92	0
NO ₂ 20–34	2,266	-0.6 (-2.3, 1.1)	0.47	0
AC growth at 0–12				
NO ₂ 0–12	2,402	-2.1 (-3.7, -0.6)	0.01	20.4
AC growth at 12–20				
NO ₂ 0–12	2,250	0.8 (-0.9, 2.4)	0.37	14.1
NO ₂ 12–20	2,323	0.8 (-0.8, 2.4)	0.31	0
AC growth at 20–34				
NO ₂ 0–12	2,323	-1.8 (-3.3, -0.2)	0.03	0
NO ₂ 12–20	2,324	-1.7 (-3.3, -0.1)	0.04	0
NO ₂ 20–34	2,141	-0.2 (-2.0, 1.6)	0.81	6.4
EFW growth at 0–12				
NO ₂ 0–12	2,399	-1.6 (-3.0, -0.3)	0.02	0
EFW growth at 12–20				
NO ₂ 0–12	2,243	0.7 (-0.9, 2.3)	0.42	0
NO ₂ 12–20	2,243	0.0 (-1.6, 1.6)	0.97	0
EFW growth at 20–34				
NO ₂ 0–12	2,309	-2.1 (-3.7, -0.5)	0.01	0
NO ₂ 12–20	2,309	-1.5 (-3.1, 0.0)	0.06	0
NO ₂ 20–34	2,252	-2.1 (-3.7, -0.6)	0.01	0

Diamètre bipariétal

Longueur fémorale

Circonférence abdominale

Poids fetal estimé

La question des fenêtres de vulnérabilité

Diminution de la pollution atmosphérique pendant les JO de Beijing

Table 2. Difference in birth weight associated with a month of pregnancy during 2008 (8 August to 24 September 2008), compared with the same dates in 2007 or 2009.

Month of pregnancy ^a	n	Unadjusted analyses		Adjusted analyses	
		Difference in birth weight (g) (95% CI)	p-Value	Difference in birth weight (g) (95% CI) ^b	p-Value
1	8,969	2 (-16, 20)	0.81	4 (-13, 21)	0.62
2	8,305	-21 (-40, -2)	0.03	-16 (-35, 2)	0.08
3	8,191	-11 (-31, 9)	0.29	4 (-15, 24)	0.68
4	8,864	-14 (-32, 4)	0.13	-4 (-22, 14)	0.64
5	9,065	2 (-16, 20)	0.86	3 (-15, 21)	0.74
6	9,294	0 (-17, 18)	0.96	5 (-12, 22)	0.57
7	9,808	0 (-17, 17)	0.99	5 (-12, 22)	0.54
8	9,307	22 (5, 40)	0.01	23 (5, 40)	0.01

^aWe defined the 1st month of pregnancy to begin with the 1st day after the last menstrual period. ^bAll models included indicator variables for gestational age (complete weeks) at delivery, residential district, maternal education (bachelor's degree, some college or technical school, high school or less), and a smooth term for maternal age (smoothing spline with 4 degrees of freedom).

Evidence scientifique – PM_{2.5}, NO₂ et issues de grossesse

	Evidence scientifique	NO ₂	PM _{2.5}
Croissance du foetus	↑	Suggestif mais insuffisant	Suggère une association causale
Poids de naissance, petit poids de naissance		Inconsistent	Suggère une association causale
Naissance prématurée		Inconsistent	Probable
Malformations congénitales		Faible niveau de preuve	Faible niveau de preuve
Mortalité postnatale		Faible niveau de preuve	Faible niveau de preuve

Impact en santé publique - pollution de l'air et poids de naissance

9,4 % petit poids de naissance (<2500gr)

10,8 % petit poids de naissance (<2500gr)

Des effets suspectés qui suscitent un intérêt croissant

Troubles du neurodéveloppement

- développement psychomoteur
- développement intellectuel
- trouble déficitaire de l'attention
- trouble du spectre de l'autisme

Clifford 2016, Fordyce 2018, Xu 2016, Chiu 2016, Rahman 2022

Effets différents chez les filles et les garçons

(Chiu et al. 2016, Hsu et al. 2015, Rosa 2017)

Troubles métaboliques

- Poids, taille, IMC de l'enfant d'âge préscolaire et scolaire

(Fossati 2020, Clemente 2017, Kim 2016, Fleisch 2015, 2018)

Pollution de l'air et développement pulmonaire

Développement pulmonaire

Développement de la fonction respiratoire

Développement normal et pathologique

Importance de la période foetale et 3 premières années de vie

Trajectoires de la fonction respiratoire dans l'enfance et de l'enfance à l'âge adulte

Trajectoires déterminées très précocement

Belgrave. *Lancet Respir Med* 2017

Bui. *Lancet Respir Med* 2017

La moitié des BPCO de l'adulte ont probablement une origine pédiatrique

DOHaD

- Lien entre poids de naissance et infections de la petite enfance et morbidité pulmonaire
 - Suivi de 5728 hommes nés entre 1911 et 1930 et revus dans les années 1980. 1153 visités à dom
 - Lien entre poids de naissance et VEMS
 - Lien entre poids de naissance et DC par BPCO

Birth weight (lb)	No of men	Forced expiratory volume (l)
≤5.5	33	2.28
-6.5	103	2.41
-7.5	258	2.44
-8.5	242	2.52
-9.5	132	2.55
>9.5	57	2.57
All	825	2.48*

Taux standardisé mortalité	
Chronic obstructive airways disease	
Weight (lb):	
At 1 year	
≤18.0	111 (6)
-20.0	87 (13)
-22.0	65 (17)
-24.0	60 (13)
-26.0	44 (5)
≥27.0	25 (1)
At birth	
≤5.5	131 (5)
-6.5	69 (7)
-7.5	80 (18)
-8.5	46 (12)
-9.5	79 (11)
>9.5	28 (2)
All	66 (55)

Un exemple bien connu des effets précoces: exposition au tabagisme

- Et risque de sifflement avant 2 ans

- Méta-analyse de 15 cohortes de naissance, incluant plus de 30 000 enf.

	Prenatal maternal active smoking	Prenatal maternal passive smoking	Postnatal infant passive smoking	Adjusted OR (95% CI)*
Nonsmoking mothers, mothers/infants not exposed to passive smoking				
1) Unexposed	No	No	No	1.00
Nonsmoking mothers, mothers/infants exposed to SHS				
2) Prenatal passive smoking	No	Yes	No	1.11 (1.03–1.20)
3) Postnatal passive smoking	No	No	Yes	1.06 (0.93–1.20)
4) Prenatal passive smoking + postnatal passive smoking	No	Yes	Yes	1.29 (1.19–1.40)
Active smoking mothers[¶]				
5) Prenatal active smoking, no prenatal or postnatal passive smoking	Yes	No	No	1.33 (1.03–1.71)
6) Prenatal active smoking + prenatal passive smoking	Yes	Yes	No	1.51 (1.29–1.77)
7) Prenatal active smoking + postnatal passive smoking	Yes	No	Yes	1.74 (1.45–2.09)
8) Prenatal active smoking + prenatal passive smoking + postnatal passive smoking	Yes	Yes	Yes	1.73 (1.59–1.88)

- Augmentation progressive du risque (OR) avec le niveau d'exposition au tabac passif et actif de la mère en anté et post natal

Un exemple bien connu des effets précoces: exposition au tabagisme

- Et déficit de fonction respiratoire
 - 20 000 enf 6-12 ans. Tabac in utéro recueilli par questionnaire

Grosses voies
aériennes

Petites voies
aériennes

Exposition à la pollution atmosphérique et risque d'asthme

- Risque d'avoir de l'asthme (incidence) augmente en lien avec expositions au trafic automobile chez des enfants de 6 ans: HR de 1,61 pour un modèle combinant l'exposition au domicile et à l'école (*Mc Connell. Env Health Persp 2010*)
- Risque d'avoir de l'asthme en lien avec l'exposition précoce à la PA

- 736 enf nés à terme
- Modèle complexe d'exposition aux PM2,5 à l'adresse résidentielle des mères pdt la grossesse, moyenne hebdomadaire
- Asthme « ever » à 6 ans: 15 % (filles 11,9 %, garçons 17,9 %)
- Relation entre l'exposition dans les 2 premiers trimestres (surtout le 2ème) et le risque d'asthme à 6 ans

Mesure de la fonction respiratoire chez l'enfant : un challenge

- Après 6 ans: spirométrie en expiration forcée.
 - Assez facile mais nécessite une bonne coopération. Reproductibilité
 - Mesure de VEMS et CV.
- Avant 6 ans: mesures complexes
 - avec coopération (pince-nez, embout buccal): oscillations forcées
 - Sans coopération
 - avec anesthésie: compression du thorax
 - sans anesthésie: possible chez des BB
 - Index de clearance pulmonaire
 - Courbes débit-volume

Exposition à la pollution atmosphérique et développement de la fonction respiratoire

- Réduction de la croissance du VEMS entre 10 et 18 ans dans les zones les plus polluées de Californie du Sud, en lien avec NO₂ et PM 2,5 (*Gauderman. NEJM 2004*)
- Amélioration de la qualité de l'air: meilleure croissance pulmonaire (*Gauderman. NEJM 2015*)

Exposition à la pollution atmosphérique pendant la grossesse et fonction respiratoire

- **Fonction respiratoire des enfants** (*Morales, Thorax 2015*)
 - Cohorte espagnole INMA. Mesure de la fonction respiratoire vers 5 ans. 680/1265 enfants.
 - Association entre [benzène] et [NO₂] moyens au lieu de résidence pdt la grossesse et baisse du VEMS
 - Pas de corrélation avec l'exposition post natale précoce ou actuelle
- **Fonction respiratoire des BB** (*Latzin, ERJ 2009*)
 - 221 couples mère enfant suisses. Mesure de la fonction respiratoire à 2 mois (ICP, CDV)
 - association entre [PM₁₀] pdt la grossesse et paramètres de la respiration (↑ FR, ↓ volume courant, ↓ débit expiratoire), indépendant de l'exposition post natale

Et dans SEPAGES

- **Association entre PM_{2,5} et leur potentiel oxydatif pdt la grossesse et fonction respiratoire des enfants**
 - 356 couples mère-enfant
 - exposition mesurée par des échantillonnages actifs portés par les femmes enceintes sur 2 x 1 semaine pdt la grossesse.
 - Mesure du PO à partir des particules fines recueillies sur le filtre par des techniques chimiques et physico-chimiques
 - Fonction respiratoire mesurée à 2 mois (ICP, CDV) et 3 ans (OF)
 - Association entre augmentation de l'exposition au PO et:
 - Diminution des volumes pulmonaires (CRF, volume courant) à la naissance
 - Résistance des voies aériennes à 3 ans

Mécanismes suggérés

Origines développementales des maladies et de la santé

Exposome urbain (pollution de l'air, climat,...)

Mécanismes de régulation de l'expression des gènes qui ne dépendent pas de la séquence d'ADN

Croissance, développement neuropsychologique, respiratoire, etc.

Dysfonctionnements et maladies chroniques métaboliques, cardiovasculaire, respiratoires, neuropsychologiques

L'épigénétique: un exemple musical

ADN – genes

Phénotype

Epigenetique

Marques épigénétiques

Méthylation de l'ADN

Ajout d'une groupe de méthyle sur les bases de cytosines qui va pouvoir bloquer l'expression des gènes

Micro ARN

Petits ARN non codants qui vont bloquer la traduction d'ARN messager en protéines

Modifications des histones

Modifications des parties terminales des histones

Interêt pour le placenta

- Polluants de l'air peuvent atteindre le placenta et exposer ainsi le foetus (*Valentino et al., 2016; Wick et al., 2010*)
- Le placenta joue un rôle clé dans la programmation foetale:
 - soutient la santé de la mère le développement du foetus
 - fournit nutriments, oxygène, régule échanges de gaz et déchets, interactions hormonales (*Murphy et al., 2006*)
- Le placenta représente une forme d' "archive biologique" des expositions survenues au cours de la grossesse

Exposition au NO₂ et méthylation placentaire

CpGs ADORA2B (Récepteur de l'adénosine)

ADORA2B (Récepteur de l'adénosine)

- ⇒ Associé à l'hypoxie et pré-eclampsie chez la femme enceinte (*Jia et al 2012, Acurio et al 2014, Darashchonak et al 2014*)
- ⇒ Activation d'ADORA2B contribue à la pathogénèse de la pré-eclampsie (*Huang et al., 2017*), RCIU, réduction de la taille du placenta (*Iriyama et al., 2015*).
- ⇒ Pré-eclampsie associée à la pollution de l'air (*Pedersen et al., 2014*)

Tabagisme maternel et épigénétique placentaire

152 régions affectés par des modifications de méthylation de l'ADN placentaire : effets **réversibles** (non observés chez les ex-fumeuses)

26 régions affectés par des modifications de méthylation de l'ADN placentaire : effets **persistants** malgré l'arrêt du tabac (aussi observés chez les fumeuses). **Mémoire de l'exposition pré-conceptionnelle au tabac ?**

Tabagisme maternel et epigenetique placentaire: genes soumis à empreinte

Origines développementales des maladies et de la santé

Exposome urbain (pollution de l'air, climat,...)

Epidémiologie épigénétique

- Prometteuse pour élucider une partie des mécanismes, pour identifier des biomarqueurs d'exposition et d'effets
- Enjeux et défis majeurs: conséquences fonctionnelles méconnues, spécificité tissulaire élevée, évolution temporelle (études longitudinales), machinerie épigénétique (micro ARN, histones)

Croissance, développement neuropsychologique, respiratoire, etc.

Dysfonctionnements et maladies chroniques métaboliques, cardiovasculaire, respiratoires, neuropsychologiques

Conclusions

- Effet très probablement causal de la pollution de l'air pendant la période de développement sur
 - le poids de naissance
 - la santé respiratoire (développement et exacerbations d'asthme, développement de la fonction ventilatoire notamment)
 - les troubles du neuro-développement
- Evidence scientifique plus importante pour $PM_{2.5}$ que pour NO_2
- Troubles du spectre de l'autisme: résultats discordants Europe - USA
- Besoin de travaux pour préciser les associations observées (effets sexe, fenêtre de vulnérabilité, populations rurales, mobilité des participants)
- Autres expositions (environnementales (polluants chimiques, bruit, etc) ou individuelles (tabac, alimentation, etc))